



TÜY DÖKÜM PROGRAMI

- Tüy dökümüne başlamadan önce hayvanlar tartılır , tüy öncesi ağırlıkları not alınır.
- Hayvanın önündeki yem tamamen bittikten sonra ,yem açlık dönemi boyunca hiç verilmez
- Canlı Ağırlık Kaybı iklim koşullarına göre yani Havanın sıcak yada soğuk olması durumu göz alınarak %23-25 'e ulaşınca kadar açlık devam ettirilir. Bu dönem içerisinde su serbest olarak verilmelidir.
- Açlık dönemin boyunca Mermer tozu ya da Mozaik vermek sakıncalıdır. En iyisi Hayvanın yumurtası bitinceye kadar az miktarda hayvanın önüne sürülmeli yumurta tamamen kesildikten sonra verilmemelidir.
- Hayvanın önündeki yem bittikten sonra ışık ayarlaması yapılarak 16,00-16,30 Saat olan aydınlatma süresi 11,30-12,00 saate çekilmelidir.
- Tüye giren sürünün geçmiş dönemdeki verim özellikleri dikkate alınarak 9-10 gün içerisinde yukarıda belirtilen (%25) düzeyde Canlı ağırlık kaybının gerçekleşebileceği tahmin edilebilir. (Çok soğuk kış döneminde 9-10 Günlük süre daha da kısılır.)
- Tüy dökümüne başlanan sürede 3 günde bir Canlı ağırlık kaybının kontrolü için tartı yapılmalıdır.
- Örnek olarak Hayvanlar 1750 gramdan ,%25 Canlı ağırlık kaybı ile 1313 grama düştü , 26 gün süre ile bu ağırlık korunacak.Hayvana 10. günden itibaren %1 Kalsiyumlu geliştirme yemi 16 gün süre ile verilir.Bu yem kısıtlı olarak günde 40-60 gram/Hayvan başına hesabıyla verilmelidir.
- Hayvana bu dönemde verilecek kısıtlı yem miktarı hayvan tartılarak saptanmalıdır. Önemli olan 16 günlük periyotta kilo almadan ve ölüm vermeden hayvanı dinlendirmektir
- 16 günlük dönemin ardından %2 kalsiyum içeren yumurta başlangıç yemine geçiş yapılır. Burada yem miktarı her gün tedricen arttırılarak hayvanın kilosunu tamamlamasına imkan verilir.Bu yem %5 yumurta verimine ulaşınca kadar devam eder.
- %5 yumurta verimine ulaştıktan sonra ise hayvanın hafta yaşına uygun yumurta yemine geçilir.

Not : Mermer tozu yada Mozaik'in açlık döneminde serbest olarak hayvana verilmesi böbreklerde aşırı miktarda ürat kristallerinin oluşmasına sebep olacağı ve böbreklerin çalışmasını engelleyeceği için dikkat edilmelidir.Bu dönemde en azından yumurta kesilinceye kadar az miktarda hayvana verip sonrasında vermemek doğru bir uygulama olmaktadır.